

Objectifs et description du réseau de surveillance

1. Coordonnées du Laboratoire de Référence

Dr D. PIERARD Tél. : 02/477.50.00	UZ Brussel - Microbiologie Fax : 02/477.50.15	Av. du Laarbeek, 101 1090 Bruxelles E-mail : Labomicro@az.vub.ac.be
--------------------------------------	--	--

2. Objectifs

- estimation de la tendance évolutive du nombre de diagnostics d'*E. coli* (1998-2005),
- estimation du taux d'incidence nationale et par arrondissement,
- présentation des principales caractéristiques épidémiologiques des patients.

3. Définition des cas

- seulement les isollements VTEC ou EHEC (0157:H7 et autres) provenant d'échantillons de selles.

4. Evolution du taux de participation

- 18 laboratoires ayant enregistré au moins 1 infection, soit 16% des L.V.,
- répartition de ces 18 laboratoires sur 13/43 arrondissements, dont 12 en Flandre, 5 en Wallonie et 1 à Bruxelles (tableau 1).

Tableau 1 : *E. coli* : répartition des laboratoires par arrondissement (N, %; 1998-2005)

Arrondissement	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Antwerpen	2	17	1	8	1	9	2	18	1	8	2	20	1	10	3	30
Mechelen	1	17	0	0	1	17	0	0	3	50	1	14	2	29	2	29
Turnhout	1	17	1	17	1	17	1	17	1	20	1	20	1	20	1	20
Halle-Vilvoorde	0	0	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	--	--	--
Leuven	3	60	2	40	2	40	0	0	3	60	0	0	2	40	0	0
Brugge	1	25	1	25	0	0	0	0	2	50	2	50	1	25	0	0
Diksmuide	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ieper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Kortrijk	2	33	2	40	1	20	1	20	2	40	0	0	1	25	2	50
Oostende	0	0	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roeselare	0	0	0	0	0	0	1	50	2	67	1	33	0	0	1	33
Tielt	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veurne	0	0	0	0	0	0	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--
Aalst	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	0	0	0	0
Dendermonde	1	50	1	50	1	50	0	0	1	50	0	0	1	100	1	100
Eeklo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gent	0	0	2	29	3	43	2	29	3	50	2	40	1	20	1	20
Oudenaarde	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St.-Niklaas	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	0	0	1	33	0	0
Hasselt	1	14	3	50	3	50	1	17	3	60	2	40	2	40	0	0
Maaseik	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tongeren	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vlaanderen	14	18	15	20	16	22	10	14	23	34	12	19	13	21	12	20
Bruxelles	1	7	2	15	1	8	1	6	1	7	2	13	2	14	1	7
Nivelles	0	0	1	50	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0
Ath	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charleroi	0	0	3	60	0	0	1	20	0	0	2	50	1	25	1	25
Mons	1	33	1	33	0	0	0	0	0	0	1	33	0	0	0	0
Mouscron	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soignies	0	0	0	0	0	0	2	67	0	0	1	25	0	0	1	25
Thuin	0	0	2	50	2	50	1	25	1	25	2	50	1	25	2	50
Tournai	0	0	1	33	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huy	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Liège	1	17	1	20	1	20	1	20	0	0	1	25	0	0	0	0
Verviers	0	0	1	25	1	25	1	25	1	25	0	0	2	50	1	25
Waremmes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Arlon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bastogne	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Marche-en-Famenne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Neufchâteau	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
Virton	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dinant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namur	0	0	0	0	1	33	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Philippeville	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wallonie	2	5	11	27	6	15	8	21	5	13	7	18	4	11	5	14
Belgique	17	13	28	22	23	18	19	15	29	24	21	18	19	17	18	16

N : nombre de laboratoires vigies ayant diagnostiqué au moins 1 cas

IPH - Epidemiologie k39_t1

% : (nombre de laboratoires vigies ayant diagnostiqué au moins 1 cas/nombre total de laboratoires vigies) x 100

- stabilisation depuis 2001 du nombre de laboratoires ayant enregistré au moins 1 infection (tableau 2).

Tableau 2 : *E. coli* : évolution du taux de participation (1995-2005)

Année	Laboratoires ayant diagnostiqué au moins 1 cas		Année	Laboratoires ayant diagnostiqué au moins 1 cas	
	N	%		N	%
1995	18	13,3	2001	19	15,0
1996	19	13,6	2002	29	24,0
1997	9	6,7	2003	21	18,1
1998	17	12,8	2004	19	16,8
1999	28	21,7	2005	18	16,4
2000	23	18,1			

IPH - Epidemiologie k39_t2

Principales caractéristiques épidémiologiques

1. Evolution de la fréquence d'enregistrement

- stabilisation de la fréquence d'enregistrement, à l'exception de 2002, par rapport aux années précédentes (tableaux 3 et 4).

Tableau 3 : *E. coli* : évolution de la fréquence d'enregistrement (N, 1995-2005)

Année	Nombre de cas	Nombre d'arrondissements avec au moins un cas	Année	Nombre de cas	Nombre d'arrondissements avec au moins un cas
1996	62	16	2002	132	18
1997	32	13	2003	56	19
1998	42	15	2004	60	17
1999	60	19	2005	60	22
2000	62	17			

IPH - Epidemiologie k39_t3

Tableau 4 : *E. coli* : évolution de la fréquence d'enregistrement (1995-2005)

Année	Nombre de cas	Nombre moyen de cas/labo/an	Année	Nombre de cas	Nombre moyen de cas/labo/an
1996	62	0,4	2002	132	1,1
1997	32	0,2	2003	56	0,5
1998	42	0,3	2004	60	0,5
1999	60	0,5	2005	60	0,5
2000	62	0,5			

IPH - Epidemiologie k39_t4

2. Répartition par sexe et âge

- 38% des diagnostics chez des hommes en 2005 (rapport H/F : 0,6/1),
- 25% des diagnostics chez des enfants entre 1 et 4 ans,
- 18% des diagnostics chez des personnes âgées entre 45 et 64 ans (tableau 5).

Tableau 5 : *E. coli* : répartition par sexe et par groupe d'âge (N, %; 2005)

Groupe d'âge (ans)	Hommes		Femmes		Total	
	N	%	N	%	N	%
< 1	6	26,1	5	13,5	11	18,3
1 - 4	6	26,1	9	24,3	15	25,0
5 - 14	3	13,0	9	24,3	12	20,0
15 - 24	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 44	2	8,7	2	5,4	4	6,7
45 - 64	4	17,4	7	18,9	11	18,3
≥ 65	2	8,7	5	13,5	7	11,7
Total	23	100,0	37	100,0	60	100,0

IPH - Epidemiologie k39_t5

Conclusions

- Stabilisation de la fréquence d'enregistrement, observée également par le laboratoire de référence.